

# Boletín de Perspectivas Climáticas

Junio – Julio - Agosto

2021



**dmh**  
Dirección de  
Meteorología e Hidrología

# Presentación

El clima de un lugar afecta a la vida cotidiana, las actividades económicas y las condiciones sociales y culturales de un lugar. En la Dirección de Meteorología e Hidrología se elabora información climática útil para diferentes sectores, cuyos representantes toman decisiones vitales para el país, las perspectivas climáticas o pronósticos estacionales es una de ellas.

Los resultados de estas predicciones no se refiere al estado del tiempo, más bien estima la probabilidad de que ciertas condiciones sean inhabitualmente frecuentes, persistentes o intensas en un periodo de tres meses. Esto permite predecir por ejemplo un período lluvioso o un periodo anormalmente cálido sin especificar eventos intensos de corta duración que puede ocurrir dentro del periodo.

## Recuerde :

### Tiempo:

El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento dado. Se describe por medio de los elementos meteorológicos, por ejemplo temperatura, viento, humedad y nubosidad.

### Clima:

El clima se distingue del tiempo por ser el conjunto de las condiciones meteorológicas en un lugar o una región determinada durante un período largo, normalmente de 30 años o más.

# Contenido

3

- Condiciones oceánicas
- Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO

4

- Perspectivas climáticas para Paraguay
- Metodología
- Referencias para interpretar los mapas

5

- Pronóstico de Precipitación

6

- Pronóstico de Temperatura media

7

- Pronóstico de Temperatura máxima media

8

- Pronóstico de Temperatura mínima media

9

- Normales Climatológicas del Trimestre

10

- Normales climatológicas del Trimestre


11

- Terminología

## Condiciones oceánicas

En las últimas cuatro semanas, las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) denotaron valores muy cercanos al promedio en gran parte del Océano Pacífico Ecuatorial. El Índice de Oscilación del Sur indica condiciones neutrales.

Los valores de las anomalías promedio en la última semana en las regiones Niño fueron de  $-0.2\text{ °C}$  en la región 3.4,  $-0.2\text{ °C}$  en la región 3,  $-0.2\text{ °C}$  en la región 4 y de  $-0.4\text{ °C}$  en la región 1+2.




**Figura 1.** Anomalía de la temperatura superficial del mar en  $^{\circ}\text{C}$  promediada en la semana del 9 de mayo al 5 de junio de 2021. Fuente: IRI. (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad).

## Pronóstico de la TSM y condiciones ENSO.

La mayoría de los centros mundiales de predicción del clima prevén la continuidad de las condiciones neutrales durante el trimestre Junio – Julio - Agosto de 2021, con alta probabilidad de mantenerse bajo esta condición en lo que resta del invierno.

Con base a las salidas de los multimodelos, las probabilidades para el trimestre considerado, para un evento de El Niño es del **4%**, condiciones neutrales **67%** y de La Niña **29%**.



**Figura 2.** Probabilidad de fases del ENSO para la región de El Niño 3.4 actualizado al 19 de mayo de 2021. Fuente: IRI (Instituto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad).

4

# Perspectivas climáticas para Paraguay



### Metodología:

Para la elaboración del pronóstico estacional se utilizan modelos estadísticos y dinámicos. En la Dirección de Meteorología e Hidrología se corre el CPT (Climate Prediction Tool), el cual es una herramienta de gran uso a nivel mundial; este modelo genera pronósticos estacionales (trimensuales) a partir del análisis estadístico de dos variables meteorológicas, una predictora (Temperatura Superficial del Mar, altura geopotencial u otro) y otra predictante (Temperatura y Precipitación). A parte del CPT, también se analizan las salidas de los diferentes modelos dinámicos generados por los grandes centros mundiales de predicción del clima (CPTec, NOAA, ECMWF, etc.).

### Referencias para interpretar los mapas:

Los pronósticos que se presentan a continuación indican la probabilidad de que la variable pronosticada se encuentre en tres categorías, denominadas terciles: normal, superior e inferior, éstos indican si la precipitación o la temperatura registrarán valores por encima del percentil 66 (categoría superior), por debajo del percentil 33 (categoría inferior) o entre ambos límites que sería la categoría normal.

1 Tercil: los terciles se consiguen al dividir una serie de datos en tres partes iguales ordenados de menor a mayor. El resultado es que a cada categoría le corresponde el 33.33 % de los datos (inferior, normal, superior).

En este caso, para la localidad señalada en el Chaco existe una probabilidad de 40 % (tono verde) de que la precipitación se encuentre por encima del tercil superior (condición húmeda) en el trimestre. Sin embargo, para la indicada en la región Oriental el pronóstico indica una probabilidad de 40 % (tono amarillo) que la precipitación este por debajo del tercil inferior (condición seca) en el trimestre.




Figura 3. Mapa de ejemplo para interpretación del pronóstico estacional.

5

# Perspectivas climáticas para Paraguay



## Pronóstico de Precipitación

Se prevén precipitaciones inferiores a la normal durante el trimestre considerado sobre gran parte del país.




Figura 4. Pronóstico de Precipitación trimestre JJA 2021.

Tabla 1. Valores calculados para los terciles de precipitación. Periodo 71-00.

Estación Meteorológica	Límite inf. del tercil normal	Límite sup. del tercil normal
Adrián Jara	55,3	87,1
Bahía Negra	51,8	101,5
Mariscal Estigarribia	36,6	60,1
Puerto Casado	89,0	167,0
Pedro Juan Caballero	160,7	245,3
Pozo Colorado	59,1	113,4
Concepción	117,5	148,7
General Bruguéz	68,5	147,5
San Pedro	173,0	224,8
San Estanislao	165,2	248,9
Salto del Guairá	189,5	291,7
Aerop. Silvio Pettrossi	158,8	214,0
Paraguari	152,6	262,0
Villarrica	231,5	323,7
Coronel Oviedo	310,2	370,3
Aerop. Guaraní	279,9	449,7
Pilar	134,4	187,9
San Juan Bautista	217,6	294,3
Caazapá	225,1	328,6
Capitán Meza	217,6	294,3
Encarnación	298,5	395,2

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.

Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.

## 6 Perspectivas climáticas para Paraguay



### Pronóstico de Temperatura media

Se prevén condiciones normales en todo el país para el periodo considerado.




Figura 5. Pronóstico de Temperatura media trimestre JJA 2021.

Tabla 2. Valores calculados para los terciles de temperatura media. Periodo 71-00.

Estación Meteorológica	Límite inf. del tercil normal	Límite sup. del tercil normal
Adrián Jara	21,1	21,8
Bahía Negra	20,8	21,5
Mariscal Estigarribia	18,8	20,0
Puerto Casado	19,6	20,8
Pedro Juan Caballero	17,2	18,2
Pozo Colorado	17,6	18,7
Concepción	18,2	19,2
General Bruguéz	16,5	17,5
San Pedro	17,8	19,4
San Estanislao	17,2	17,9
Salto del Guairá	16,7	17,3
Aerop. Silvio Pettrossi	17,5	18,5
Paraguarí	17,0	18,2
Villarrica	16,7	17,7
Coronel Oviedo	16,8	17,5
Aerop. Guaraní	16,4	17,1
Pilar	16,0	17,0
San Juan Bautista	16,1	17,0
Caazapá	16,0	17,3
Capitán Meza	16,1	17,0
Encarnación	15,4	16,4

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.


Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.

# 7 Perspectivas climáticas para Paraguay



## Pronóstico de Temperatura máxima media

Se prevén valores superiores a la normal sobre el norte, en tanto que sobre el resto del país, se prevén condiciones normales.



Los círculos indican la ubicación de las estaciones meteorológicas utilizadas para el pronóstico, los colores la probabilidad calculada para la categoría.




Figura 6. Pronóstico de temperatura máxima media. JJA 2021.

Tabla 3. Valores calculados para los terciles de temperatura máxima media. Periodo 71-00.


Estación Meteorológica	Limite inf. del tercil normal	Limite sup. del tercil normal
Adrián Jara	28,8	30,0
Bahía Negra	27,2	27,9
Mariscal Estigarribia	26,3	27,3
Puerto Casado	25,9	27,3
Pedro Juan Caballero	23,9	24,5
Pozo Colorado	25,1	26,0
Concepción	25,0	25,9
General Bruguéz	23,2	24,4
San Pedro	25,1	26,0
San Estanislao	23,8	24,6
Salto del Guairá	23,7	24,3
Aerop. Silvio Pettirossi	23,3	24,2
Paraguari	23,1	24,0
Villarrica	23,5	24,1
Coronel Oviedo	23,6	24,8
Aerop. Guaraní	22,9	23,5
Pilar	21,9	22,5
San Juan Bautista	22,4	23,4
Caazapá	22,3	23,0
Capitán Meza	22,4	23,4
Encarnación	22,2	22,9

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.

Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.



## 8 Perspectivas climáticas para Paraguay



### Pronóstico de Temperatura mínima media

Valores inferiores a la normal sobre el extremo sur de la Región Oriental, mientras que sobre el resto del país se esperan condiciones normales.




Figura 7. Pronóstico de temperatura mínima media. JJA 2021.

Tabla 4. Valores calculados para los terciles de temperatura mínima media. Periodo 71-00.

Estación Meteorológica	Límite inf. del tercil normal	Límite sup. del tercil normal
Adrián Jara	14,7	15,5
Bahía Negra	15,5	17,0
Mariscal Estigarribia	12,7	14,1
Puerto Casado	14,5	15,7
Pedro Juan Caballero	12,6	13,7
Pozo Colorado	11,9	12,7
Concepción	13,2	13,9
General Bruguéz	11,4	12,7
San Pedro	12,7	14,2
San Estanislao	12,3	12,9
Salto del Guairá	11,2	12,3
Aerop. Silvio Pettirossi	13,2	14,1
Paraguarí	12,7	13,5
Villarrica	11,8	12,6
Coronel Oviedo	12,1	12,4
Aerop. Guaraní	11,6	12,4
Pilar	11,7	12,7
San Juan Bautista	11,2	12,0
Caazapá	11,2	12,3
Capitán Meza	11,2	12,0
Encarnación	9,8	11,0

Obs 1: Los colores que resaltan en la tabla indican la probabilidad asociada al tercil del mapa.

Obs 2: Las filas que no tienen colores se refieren a localidades que no cuentan con una serie de datos continua de al menos 30 años y con el mínimo de faltantes necesarias para la generación del pronóstico.

## 9 Normales Climatológicas del Trimestre




Figura 8. Precipitación total normal. JJA.




Figura 9. Temperatura normal. JJA.

10

## Normales Climatológicas del Trimestre




Figura 10. Temperatura máxima normal. JJA.




Figura 11. Temperatura mínima normal. JJA.

## 11 Terminología

**Normal climatológica:** son valores estándares para diferentes parámetros meteorológicos, calculados bajo los criterios y normas establecidos por la OMM para un periodo de tiempo específico (30 años).

**Periodo climatológico:** periodo de tiempo, por lo general 30 años, para poder definir el comportamiento normal de una variable meteorológica. Actualmente el último periodo climatológico es el 1981-2010.

**Terciles:** los terciles se consiguen al dividir una serie de datos en tres partes iguales ordenados de menor a mayor, obteniéndose que a cada categoría le corresponde el 33.33 % de los datos (inferior, normal, superior).

**ENSO:** El Niño y La Niña son las fases cálidas y frías respectivamente de un patrón climático recurrente a lo largo del Océano Pacífico tropical: El Niño-Oscilación del Sur, o "ENSO". Tiene un ciclo de cada dos a siete años, y cada fase desencadena variaciones en la temperatura, la precipitación y los vientos. Estos cambios interrumpen los movimientos de aire a gran escala en los trópicos, desencadenando efectos secundarios globales.

**Modelos numéricos:** un modelo numérico es un conjunto de expresiones matemáticas que describen el comportamiento de un sistema físico-químico. Estas ecuaciones son resueltas en un entorno de cálculo computacional. Están basadas en el conocimiento científico del comportamiento de la atmósfera y sus interacciones con el medio que la circunda, tanto a nivel dinámico como termodinámico

**Anomalías:** valor resultante al contrastar el valor de un parámetro meteorológico específico con su normal para un periodo determinado.

**El Niño:** fase cálida del ENSO caracterizado por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4). Para que se dé el inicio de este fenómeno es necesario que las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 sea igual o mayor a 0,5°C, promediada en el curso de tres meses consecutivos.

**La Niña:** fase fría del ENSO caracterizado por un enfriamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4). Para que se dé el inicio de este fenómeno es necesario que las anomalías de la temperatura superficial del mar (TSM) en la región Niño 3.4 sea igual o menor a -0,5 °C, promediada en el curso de tres meses consecutivos.




Figura 12. Regiones Niño. Fuente: CPC-NOAA.



**DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA**

■ TETÃ REKUÁI  
■ GOBIERNO NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

**Félix Kanazawa**

Presidente, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

**Raúl Rodas**

Director, Dirección de Meteorología e Hidrología

**Eduardo Mingo**

Sub Director, Sub Dirección de Meteorología

**Roberto Salinas**

Gerente, Gerencia de Climatología

**Marco Maqueda**

Jefe, Departamento de Servicios Climáticos

**Equipo de trabajo:**

- Belén Recalde
- Ana Pereira
- Liz Fernández

**Colaboradores:**

- Héctor López
- Jefe, Departamento de Banco de Datos

**Observadores Meteorológicos**

Encuentre las últimas actualizaciones meteorológicas e hidrológicas:

Sitio web: <https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/>

Seguinos cómo:

Twitter oficial: @DMH\_paraguay

Facebook oficial : Dirección de Meteorología e Hidrología - D M H



Centro Meteorológico Nacional

Cnel. Francisco López 1080 c/ De la Conquista

Tel: +595 21 438 1000

Fax: +595 21 438 1220